



使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

サラリ「顆粒」

総合感冒薬

〔特徴〕

サラリ「顆粒」は、「かぜ」のさまざまな症状を改善する総合感冒薬です。

- ・解熱鎮痛成分のアセトアミノフェンやエテンザミド、鎮咳成分のジヒドロコデインリン酸塩などはたらきで、頭痛、発熱、せきなどの症状を改善します。
- ・のどの炎症、痛みなどに効果をあらわす生薬・カンゾウエキス末や、アレルギー症状に効果のあるd-クロールフェニラミンマレイン酸塩、かぜにより消耗しやすいビタミンB₁(ペンフォチアミン)を配合しています。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)12歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
- (7)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



〔効 能〕

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

〔用法・用量〕

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
12歳以上15歳未満	2 / 3 包	
12歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)用法・用量を厳守してください。

〔成 分〕

3包(成人の1日服用量)中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	600mg	発熱・頭痛・関節の痛み・筋肉の痛みに効果をあらわします。
エテンザミド	500mg	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	気管支をひろげ、せきを鎮めます。
無水カフェイン	125mg	「かぜ」による頭痛を和らげます。
ベンフォチアミン	25mg	吸収のよいビタミンB ₁ 誘導体で、「かぜ」の時に消耗の激しいビタミンB ₁ をおぎないます。
カンゾウエキス末	714mg (原生薬として 4998mg)	のどの炎症、痛みにも効果をあらわします。また、たんをとりやすくします。

添加物：D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、軽質無水ケイ酸

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割して服用した残りを使用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

〔包 装〕

1包1.2g 8包入

本剤を服用されて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、下記にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口
富山県富山市三番町3-10 電話：(076)421-5531
受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)



発売元
富山めぐみ製薬株式会社
富山県富山市三番町3-10

製造販売元

ダイト株式会社
富山県富山市八日町326番地